

۷ توصیه ورزشی به مبتلایان دیابت

## پا به پای دیابت راه بروید!



آن هاست. ترکیبی کار نکند و مراقب آسیب های جزئی ورزش باشید چون بدن یک فرد دیابتی به خاطر آسیب عروق و اعصاب کوچک، هم زودتر آسیب می بیند، هم دیرتر بهبود می یابد. کشش راحت و مناسب بپوشید و ورزش های خشن انجام ندهید.

۶ **کنترل قند خون بعد از ورزش:** مدتی بعد از پایان ورزش هم باید قند خونتان را اندازه بگیرید. ممکن است چند ساعت بعد از ورزش ناگهان با افت شدید قند مواجه شوید؛ چون عضلات موقع ورزش قند ذخیره خود را مصرف می کنند و بعد از اتمام ورزش به سراغ قند خون می روند تا ذخایر مصرفی را جبران کنند.

۷ **ورزش منظم و مناسب با شرایط:** ورزش و فعلیت بدنی باید مناسب با شرایط و وضعیت سلامت شخص باشد و به طور منظم و مستمر انجام گیرد. زمان ورزش بهتر است عصر باشد. شما می توانید ورزش های سبک مثل نرم شد و بیاده روی انجام دهید یا با پیش کش خود دریاره نوع ورزشی که انجام می دهید مشورت کنید. ورزش، به خصوص ورزش های هوایی، باعث تقویت دستگاه قلب و گردش خون نیز می شود و این امر در افراد دیابتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به آنها کم می کند از خطر سکته های قلبی و مغزی نابینایی و آسیب های عصبی در امان بمانند.

۸ **پیاده روی روزانه:** ۳۰ دقیقه پیاده روی روزانه! این معمولاً اولین چیزی است که به بیمار دیابتی توصیه می شود. ورزش علاوه بر کاهش وزن بدن و کمک به تناسب اندام، باعث کاهش خطر بیماری های قلبی می شود و از عوامل مهم کنترل قند خون به حساب می آید. اما دیابتی ها در این مورد هم نباید گدار به آب بزنند چون آنها مجاز نیستند هر ورزشی را هرچقدر که دلشان خواست، انجام دهند. پس قبل از شروع هر ورزشی، از پیشگذشتان اجازه بگیرید و درباره نوع، شدت و مدت ورزشتان با پژوهش مشورت و از او سوال کنید که چگونه باید داروهایتان را قبل و بعد از ورزش مصرف کنید.

۹ **کنترل قند خون قبل از ورزش:** اگر انسولین می زنید، ۳۰ دقیقه قبل از شروع ورزش، قند خونتان را چک کنید تا موقع ورزش با افت شدید قند مواجه نشوید.

۱۰ **بی گدار به آب نزنید:** قبل از ورزش، قند خونتان را گلوكومتر اندازه بگیرید. اگر قند تان بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ بود، با خیال راحت ورزش کنید اما اگر قند تان زیر ۱۰۰ یا بالای ۲۵۰ بود، بهتر است موقعتا دور ورزش را خطا بشکید تا وضعیتتان متعادل شود؛ و گرنه در حالت اول، ممکن است دچار افت شدید قند خون (حمله هیپوگلیسمی) و بیهوشی شوید و در حالت دوم، دچار حمله تکتوسیدور و کاهش سطح هوشیاری. اگر قند خونتان زیر ۱۰۰ بود، حتما باید ابتدا یک وعده مختصراً غذای حاوی کربوهیدرات یا مقداری میوه و بیسکوئیت بخوردی، کمی صبر کنید و بعد به ورزش بپردازید.

۱۱ **شناسایی علایم افت قند خون:** اگر می خواهید طولانی مدت ورزش کنید، باید هر نیم ساعت قند خونتان را اندازه بگیرید. اگر قند تان زیر ۷۰ بود یا دچار ضعف و بدن لرزه شدید، باید ورزش را قطع کنید و یک چیز شیرین بخوردید؛ مثلا آب میوه، شکلات یا آبنبات.

۱۲ **کشش راحت و مناسب:** ترکیب ورزش های هوایی با ورزش های قدرتی، مؤثرتر از انجام یکی از