

یا من اسمه دوae و ذکره شفاء

راهنمای بیمار

آمپول انوکسایپارین



واحد آموزش به بیمار

۵- **نباشد** سرپوش سوزن را برای درآوردن بپیچانید چرا که ممکن است باعث خم شدن سوزن گردد .

۶- **نباشد** انوکسایپارین را درون زخم ، کبودی تزریق کنید .

۷- انوکسایپارین را در یخچال نگهداری کنید ، از یخ زدگی آن جلوگیری کنید و بلافصله پس از درآوردن از یخچال آن را تزریق نکنید .

درجه صورت بگیرد زیرا بافت زیر جلد بازو
بسیار کمتر از شکم بوده و در تزریق
درجه احتمال ورود دارو به عضله وجود دارد

پس از تزریق

این امکان وجود دارد که تا حدود ۲۰ دقیقه بعد از تزریق در محل تزریق احساس سوزش و گزگز کنید . این مسئله طبیعی بوده و جای هیچ نگرانی نیست . فقط ناحیه تزریق را نخارانید و با دست آن را فشار ندهید چرا که بعدا در اطراف محل تزریق شاهد کبودی خواهید شد .

باید ها و نباید ها در استفاده از انوکسایپارین

۱- دارو را به همان میزان تجویز پزشک و هر روز در زمان معین معرف نمایید .
۲- هنگام اصلاح صورت و استفاده از چاقو و سایر ابزار برنده دقت کافی به عمل آورید .
۳- در صورت استفاده از داروهای دیگر و مکمل های غذایی یا گیاهی با پیشک خود مشورت کنید .

۴- **نباشد** پس از برداشتن سرپوش سوزن آن را به طرف پایین بگیرید و یا اجازه دهید با چیزی تماس پیدا کند .

عوارض جانبی ناشی از انوکسایپارین

۱- ایجاد کبودی ، حساسیت و واکنش های موضعی خفیف ۲- درد -۳- هماتوم (خونریزی درون پوستی که ایجاد توده می کند .) قرمزی پوست و ندول (برجستگی کوچک و سفت موضعی در محل تزریق) می باشد .

عوارض جانبی کمتر شایع

۱- خونریزی از محل زخم جراحی ۲- هر نوع خونریزی دیگر مانند خونریزی از محل تزریق ، خونریزی از بینی ، وجود خون در ادرار ، مشاهده خون هنگام سرفه کردن و یا استفراغ خونی ۳- کبودی غیر عادی که در اثر ضربه یا علت واضح دیگری ایجاد نشده باشد .



سایت بیمارستان : Pavehhop.Kums.ac.ir

شماره تماس : ۰۸۳۴۶۱۲۷۴۳۴ . داخلی : ۲۲۶

کلکزان یا آمپول انوکسایپارین برای پیشگیری از لخته شدن خون در وریدهای عمقی بدن به کار می رود . جدا شدن این لخته ها از دیواره رگ منجر به انتقال آن به انسداد مسیر رگ های ریه و مغز می شود.

عوامل مستعد کننده ایجاد لخته در ورید های عمقی

* عدم تحرک به مدت طولانی

* سن بالای ۴۰ سال ، چاقی

* سابقه ابتلا به ایجاد لخته در ورید های عمقی

* نارسایی قلبی و ریوی

* ذات الريه

* اختلالات خونی یا عروقی

* مصرف قرص های ضد بارداری

علائم ایجاد لخته در ورید های عمقی

۱- درد یا حساسیت در لمس -۲- تورم و تغییر رنگ یا قرمزی عضو -۳- گرم شدن پا یا ساق پا علایم جابجایی لخته خون در رگ های ریه

۱- درد قفسه سینه ، تنگی نفس ، ضعف و تب خفیف -۲- نبض تندر ، تنفس تندر و سریع

۳- سرفه همراه با خلط خونی یا بدون خلط خونی

نحوه ی تزریق انوکسایپارین

۱- اول دستان خود را با آب و صابون بشویید .

۲- پس از تمیز کردن محل تزریق با الكل اجازه دهید آن محل خشک شود ، سپس تزریق را آغاز کنید چون وجود رطوبت موجب افزایش احساس سوزش می شود .

۳- سرنگ را در دست خود گرفته و غلاف پلاستیکی آن را با دقیق بیرون بکشید (دقیق کنید که سوزن سرنگ به جایی بخورد نکند .

۴- چنانچه قطره از قسمت انتهای سوزن خارج شد پیش از تزریق با ضربه زدن بر روی سرنگ آن را برطرف کنید .

۵- تزریق را آغاز کنید قبل از تزریق سرنگ آماده شده را هوایگیری نکنید .

۶- تزریق در حالت نشسته یا خوابیده انجام دهید .

۷- قسمتی از سطح شکم در طرف چپ و یا راست ، از پهلوها تا ۵ سانتی متر به ناف را انتخاب کنید ، زیرا دارای بافت زیر جلدی آزاد می باشد .

۸- پوست تمیز ناحیه شکم را با دست دیگر خود به کمک تنگشتن شست و سبابه (نیشگون مانند بالا بیاورید ، فشار ملایم وارد کنید تا فقط یک پشته ایجاد شود) سپس سرنگ را در حالت ۹۰ درجه تا آخر وارد محل برجسته کنید .

۹- چین پوستی شکم را تا پایان تزریق به آرامی نگه دارید چون در این حالت دارو تنها وارد بافت چربی شکم می شود و به عضله نمی رسد .

۱۰- بافت زیر جلدی همان بافت چربی دار که بین پوست و ماهیچه قرار دارد .

۱۱- همانطور که محل برجسته در دست شماست تزریق را به آرامی و با دقت انجام دهید تا جایی که انوکسایپارین موجود در سرنگ خالی شود .

۱۲- همانطور که محل برجسته در دست شماست سرنگ را به آرامی و مستقیم بیرون بکشید و سپس ناحیه تزریق را آزاد کنید .

۱۳- نوبت های بعدی را به صورت یک در میان در سمت چپ یا راست تزریق کنید . یعنی اگر دیروز در سمت راست شکم تزریق انجام شد امروز باید در سمت چپ تزریق صورت بگیرد و همینطور به تناوب ادامه می یابد .

۱۴- اگر چه در سایر نقاط نیز می توان تزریق را انجام داد مثلا در عضله بازو ، اما کناره های سطح شکم به علت جذب سریع دارو محل مناسبی برای تزریق می باشند .

۱۵- اگر احیانا تزریق انوکسایپارین به جای شکم در ناحیه بازو صورت گرفت باید این تزریق با زاویه ۴۵