


## ❖ شرح بیماری

وجود لخته خون یا ندرتاً چربی در یکی از شریان‌های تنفسی کننده بافت ریه را گویند. منشاء این لخته خون معمولاً یکی از رگ‌های اندام‌های تحتانی (پاها) یا لگن است یا ممکن است چربی متعاقب شکستگی یکی از استخوان‌های بزرگ اندام‌های تحتانی باشد. لخته از طریق جریان خون به بافت ریه رسیده که منجر به انسداد شریان‌های آن شده و ایجاد علائم می‌کند. آمبولی ریه در بزرگسالان شایع‌تر است.



## ❖ علائم:

در صورت ابتلا به آمبولی ریه ممکن است علائم زیر در فرد بروز نماید:

- ✓ تنگی نفس و درد ناگهانی قفسه سینه
- ✓ سرفه و گاهی خلط خونی
- ✓ تندی ضربان قلب

- ✓ مصرف قرص‌های ضد بارداری
- ✓ بارداری

## ❖ عوارض احتمالی

آمبولی ریه در صورت عدم درمان ممکن است شروع به حرکت به طرف قلب کند و باعث بروز مشکلات قلبی-ریوی جدی‌تری شود.

## ❖ تشخیص

- ✓ شرح حال و معاینه دقیق
- ✓ بررسی‌های تشخیصی
- ✓ تصویر رادیولوژی قفسه سینه
- ✓ اسکن ریه
- ✓ آنژیوگرافی ریه
- ✓ نوار قلب
- ✓ سمع قلب و ریه و آزمایش‌های خون جهت اندازه‌گیری عوامل انعقادی

## ❖ درمان

- هدف درمانی عبارتند از:
- ✓ حفظ عملکرد قلب و ریه در حد قابل قبول (تا برطرف شدن لخته) و جلوگیری از عود آمبولی
  - ✓ اقدامات درمانی که ممکن است با توجه به علائم و شدت بیماری برای بیمار انجام شود شامل:

- ✓ غش یا حالت غش
- ✓ تب مختصر
- ✓ احتمال تورم اندام تحتانی

## ❖ علل شایع

از عواملی که باعث ایجاد آمبولی ریه می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ✓ لخته‌شدن خون در وریدهای عمقی، این حالت هر زمان که خون در داخل ورید تجمع یافته و به خوبی جریان نداشته باشد می‌تواند ایجاد شود.
- ✓ آمبولی چربی ناشی از شکستگی استخوان

## ❖ عوامل خطر

- ✓ سن بالای ۶۰ سال
- ✓ استراحت طولانی مدت در بستر به هر علت
- ✓ نشستن طولانی مدت در یک وضعیت ثابت مانند مسافت با هوایپیما
- ✓ جراحی اخیر
- ✓ نارسایی احتقانی قلب
- ✓ اختلال ریتم قلب
- ✓ کم خونی
- ✓ غلظت بالای خون
- ✓ شکستگی استخوان
- ✓ چاقی



## ❖ دارو

پزشک با توجه به شدت و علائم بیماری ممکن است داروهای زیر را برای بیمار تجویز نماید:

- ✓ داروهای ضد انعقاد جهت حل کردن لخته و جلوگیری از ایجاد دوباره آن سطح داروهای ضد انعقاد باید به طور مرتب اندازه‌گیری شود تا اطمینان حاصل شود سطح آنها در حد مطلوب و بی خطر است.

- ✓ تجویز اکسیژن، در صورت نیاز
- ✓ تجویز آنتی‌بیوتیک، در موارد آمبولی عفونی
- ✓ سایر داروها بر حسب نیاز

## ❖ در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- ✓ درد قفسه سینه
- ✓ سرفه همراه خلط خونی
- ✓ کوتاهی نفس
- ✓ تشدید تورم و درد ساق پا

- ✓ ممکن است به منظور بستن ورید بزرگ منتهی به قلب و ریه (وریداچوف) یا قرار دادن یک صافی در داخل آن برای جلوگیری از عبور لخته‌ها به سمت قلب، جراحی لازم باشد
- ✓ استفاده از جوراب‌کشی یا پیچیدن ساق پا با باند کشی

## ❖ فعالیت

در زمانی که به این بیماری مبتلا هستید لازم است جهت فعالیت موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

- ✓ استراحت در بستر تا رفع علائم حاد، در طی استراحت در بستر اندام‌های تحتانی را به طور مکرر حرکت دهید تا به جریان یافتن خون در آن‌ها کمک شود.
- ✓ از نشستن به حالتی که ساق‌ها یا مج‌پاها را روی یکدیگر بیندازید خودداری کنید.
- ✓ در هنگام نشستن طولانی مدت طوری بنشینید که پاها بالاتر از ران‌ها قرار گیرند.
- ✓ در هنگام خوابیدن پاها را بالاتر از سطح بستر قرار دهید.

## ❖ رژیم غذایی و تغذیه

- ✓ از یک رژیم غذایی کم‌چرب پیروی کنید.
- ✓ در صورت استفاده از داروهای ضد انعقاد خون، از محصولات دارای ویتامین مانند بروکلی، فراورده‌های سویا، سبزیجات با برگ سبز و ... با احتیاط استفاده کنید.