


مواجهات شغلی (شماره ۱۵)

گزارش فوری سانحه به سوپروایزر:

- در صورت حضور سوپروایزر کنترل عفونت با ایشان تماس حاصل فرمایید
- در صورت عدم حضور سوپروایزر کنترل عفونت با سوپروایزر بالینی تماس حاصل فرمایید
- سوپروایزر بالینی جهت اتخاذ تصمیم نهایی با سوپروایزر کنترل عفونت تماس میگیرد.
- تکمیل دقیق فرم گزارش دهی مواجهه شغلی بلافاصله بعد از بروز سانحه.
- ثبت رسمی سانحه گزارش شده در گزارشات حین کار در بخش مربوطه و دفتر پرستاری



منابع: مدیریت مواجهه شغلی با HIV, HBV, HC توصیه هایی برای
پروفیلاکسی پس از تماس مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار
ویرایش سوم مرداد ۹۳

در صورت پاشیدن خون یا مایعات بدن به چشم:

- ۱- فوراً چشم های مواجهه یافته را با آبی روان یا نرمال سالین بشویید (مواجهه یافته را در روی صندلی بنشانید سر او را عقب خم کنید چشم ها را از آب یا نرمال سالین پر کنید و سپس پلک ها را به بالا و پایین بکشید)
- ۲- در صورت داشتن لنز روی چشم آنها را خارج کنید و طبق روش فوق آنها را بشویید

در صورت پاشیدن خون یا مایعات بدن به دهان:

- ۱- فوراً خون یا مایع را بیرون بریزید.
- ۲- با آب یا سرم نمکی دهان را بشویید و بیرون بریزید و چندین بار تکرار کنید و در دهان صابون یا مواد ضد عفونی کننده به کار نبرید



تعریف مواجهه:

تماس با خون، بافت یا سایر مایعات بالقوه عفونی بدن از طریق فرو رفتن سوزن در پوست یا بریدگی با شیء تیز یا تماس این مواد با غشاء مخاطی یا پوست آسیب دیده است که می تواند HCP را در معرض عفونت HIV و HBV و HCV قرار دهد.

مایعات بالقوه عفونت زا: خون مهمترین مایع بدن است که می تواند عفونت زا باشد

مایعات زیر نیز بالقوه عفونت زا محسوب می شوند:

مایع مغزی نخاعی، سینهویال، پلور، صفاقی، پریکارد، آمیوتیک، میزان خطر انتقال عفونت HIV و HCV و HBV از این مایعات مشخص نیست.

ادرار، بزاق، خلط، مدفوع ف مواد استراغی، ترشحات بینی، اشک و عرق عفونت زا نیستند مگر اینکه خون در آنها مشاهده شود تماس مستقیم با مخاطات یا پوست آسیب دیده (مانند

در صورت بریدگی پوست با سر سوزن یا شیء تیز و برنده و یا پاشیدن خون یا مایعات بدن به مخاطات یا پوست ناسالم:

تماس بدون محافظ (با ویروس تغلیظ شده در آزمایشگاه تحقیقاتی یا تولیدی مواجهه محسوب میشود و نیازمند ارزیابی بالینی است .

برای مورد ارزیابی گاز گرفتگی انسان ارزیابی بالینی باید شامل احتمال مواجهه با پاتوزنها ی منتقل شونده از راه خون برای فرد گاز گیرنده و فرد مورد گاز گرفتگی باشد .



علاوه بر خون و مایعات آشکار خونی، منی و ترشحات واژن نیز بالقوه آلوده باید در نظر گرفته شود اما در مواجهات شغلی عملاً نقشی ندارند .

محافظت نخستین اقدام پیشگیری است .

۱- فوراً محل آسیب را با آب و صابون بشوید ۲- محل ورود شیء را زیر آب روان قرار دهید تا زمانی که خونریزی متوقف شود .

۳- اگر آب روان در دسترس نیست محل را با محلولها یا ژل شوینده دست تمیز کنید .

۴- از محلولهای قوی مانند سفید کننده استفاده نکنید .

۵- از فشردن یا مکیدن محل آسیب خودداری کنید

