

متادون :

متادون دارویی از خانواده مخدر هاست که برای کنترل درد شدید ، سرفه های غیر ارادی و شدید و علائم ترک در افراد وابسته به مواد مخدر استفاده می شود .
متادون یک داروی مخدر صنعتی قوی است که کمتر از مورفین و هرویین اعتیاد آور است . این دارو از بدو ورود به دهان قابلیت جذب دارد و پس از مصرف خوراکی ظرف مدت یکساعت اثرات دارو شروع می شود و طی ۱/۵ – ۲ ساعت به اوج خود می رسد و اثر آن تا ۱۲ ساعت در بدن باقی می ماند .

علائم مسمومیت با متادون :

- ۱-تکلم بریده بریده
- ۲-اختلال در تعادل و راه رفتن
- ۳-خواب آلودگی
- ۴-تنگی مردمک چشم
- ۵-حرکات کند بدن
- ۶-اختلال در تنفس
- ۷-شل شدن عضلات
- ۸-پوست خیس و سرد
- ۹-سیاه شدن دور لب و پوست
- ۱۰-خواب آلودگی بیش از حد
- ۱۱-تشنج
- ۱۲-گیجی و خفگی
- ۱۳-کاهش تنفس و اکسیژن رسانی
- ۱۴-مرگ

درمان مسمومیت با متادون :

به محض برخورد با فرد مشکوک با مسمومیت ، باید فوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته و تا رسیدن اورژانس بهتر است که بیمار را در وضعیت خوابیده به یک پهلو قرار داده تا از ورود ترشحات دهان و معده به مجاری راههای هوایی جلوگیری شود .

بیمار را هرگز وادار به استفراغ نکنید (در مواردی که بیش از ۵ دقیقه از مصرف دارو گذشته باشد) .

رفتن زیر دوش آب سرد ممنوع است چون دمای بدن فرد را پایین می آورد و وضعیت بیمار بدتر می شود .

راه هوایی بیمار را تا رسیدن اورژانس ۱۱۵ باز نگه دارید ، در صورتی که بیمار نفس نمی کشد و سیاه شده ، احیا اولیه را با تنفس دهان به دهان و ماساژ قلبی تا رسیدن اورژانس ۱۱۵ شروع کنید .

نکات مهم :

-از ریختن شربت متادون در شیشه نوشابه و نگهداری در یخچال و در دسترس اطفال گذاشتن آن به شدت خودداری کنید .

-این نکته بسیار مهم است که فرد هنگام مراجعه به دندانپزشکی ، مصرف متادون را گزارش دهد تا داروهایی که موجب تاثیر و تداخل با متادون می شوند را تجویز ننماید .

-توصیه می شود در دوره ترک به هیچ وجه از الکل استفاده نکنید حتی نوشیدنی های حاوی الکل نیز استفاده نگردد زیرا باعث مرگ می شود .

موضوع :

مسمومیت

با

متادون

عوارض دارویی متادون :

-خواب آلودگی

-احساس گیجی

-یبوست

-افت فشار خون

-اختلال در دید

-احتباس ادرار

-توهم

-سردرد

-تعریق

-احساس گرگرفتگی

