

درمان :

- توجه به سطح هوشیاری
- باز نگه داشتن راه هوایی
- مانیتورینگ قلبی
- در صورتی که کمتر از یک ساعت از مسمومیت گذشته باشد شستشوی معده انجام می شود.
- ذغال فعال از طریق سوند معده یا راه خوراکی
- استفاده فلومازنیل تزریقی



تشخیص :

باتوجه به علائم بالینی که شامل :

- خواب آلودگی
- اختلالات سطح هوشیاری
- تنگی نفس
- تهوع
- استفراغ
- درد قفسه سینه
- درد شکم از پالس اکسی متری
- چک قند خون
- آزمایشات ادراری
- چک سطح خونی دارو
- الکتروولیت ها
- کراتین و اوره تشخیص داده می شود



مددجوی گرامی؛ پمفلتی که در دست دارید حاوی اطلاعات ضروری در خصوص بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن می باشد.

با افزایش آگاهی و بکارگیری توصیه های مربوطه دوره نقاهت کوتاهتری خواهید داشت و از عود مجدد بیماری پیشگیری خواهد شد.

بنزودیازپین ها:

بنزودیازپین ها شامل داروهایی است که به منظور آرام بخشی ، درمان اضطراب، تشنج، بی خوابی و بی قراری تجویز می گردد. که مسمومیت با این داروها جهت سوء مصرف دارویی، اقدام به خودکشی یا بصورت تصادفی اتفاق می افتد.

نکات مهم در پیشگیری از مسمومیت

با بنزودیازپین ها :

- داروهای را دور از دید و دسترس کودکان و در ارتفاع بالا و در کمد مجهز به قفل نگهداری نمایید.
- بهتر از داروهای بیماران افسرده یا بیمارانی که تعادل رفتاری ندارند یا افرادی که سابقه اقدام به خودکشی دارند را دور از دسترس شان قرار داده و مراقبت دقیقی در خصوص میزان داروی مصرفی ایشان به عمل آورد.

مسمومیت

با بنزودیازپین ها



تهیه و تنظیم :

دفتر پرستاری - واحد آموزش سلامت

گروه هدف : مددجو

۱۴۰۱

"با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم"

منبع:

<http://vcfd.medilam.ac.ir>

<http://darman.umsu.ac.ir>

<http://treatment.sbm.ac.ir>

مراقبت های پرستاری :

- توجه به سطح هوشیاری و تغییر وضعیت ذهنی بیمار
- توجه به وضعیت تنفسی و باز نگه داشتن راه هوایی
- کنترل سطح اکسیژن خون
- کنترل علائم حیاتی و جذب و دفع مایعات

پیگیری پس از درمان :

در بیمارانی که مسمومیت با بنزودیازپین ها به دلیل سوء مصرف دارو یا اقدام به خودکشی بوده است حتماً پس از درمان مراجعه به روانپزشک داشته باشید.

