


## واریکوسل :




واریکوسل عبارت است از اتساع وریدها (سیاهرگ) که خون را از بیضه‌ها خارج می‌کنند. واریکوسل شبیه بیماری واریس در ساق پاها است. بیضه‌ها برای اینکه خوب بتوانند نطفة مردانه یا همان اسپرم تولید کنند، باید درجه حرارت آنها نیم درجه کمتر از درجه حرارت بدن باشد. به این دلیل موقعیت بیضه‌ها خارج از بدن می‌باشد. وقتی سیاهرگ‌های اطراف بیضه متورم و گشاد می‌شوند، درجه حرارت بیضه‌ها بالا رفته و ممکن است تولید اسپرم آسیب بینند. و از علل شایع ناباروری در مردان، واریکوسل بوده که به تولید و وجود ندارد که تمامی مردان با این حال دلایلی وجود ندارد. مبتلا به واریکوسل دارای مشکل در باروری باشند. بسیاری از واریکوسل‌ها در طول زمان ایجاد می‌شوند.

## علائم بیماری:

- بزرگی یا عدم تقارن بیضه‌ها
- درد مبهم در ناحیه بیضه‌ها
- احساس سنگینی یا کشیدگی در بیضه
- رگهای متسع در داخل کيسه بیضه
- کوچکی بیضه مبتلا

شایعترین فرم آن، بدون علامت بوده و بطور اتفاقی حین معاينه متوجه آن می‌گردد. در معاينه بزرگی و تورم عروق بیضه بخصوص در سمت چپ مشهود است و در حالت ایستاده با افزایش فشار شکمی تشدید می‌یابد و در حالت خوابیده از بین می‌رود.




## عارض واریکوسل:

واریکوسل می‌تواند باعث کوچک شدن بیضه تحت تاثیر شده، همچنین می‌تواند باعث نازایی و ناباروری در مردان شود. علت اینکه، واریکوسل باعث ناباروری مردان شده مشخص نیست، اما می‌تواند به دلیل افزایش دمای ناحیه، موجب تاثیر بر شکل گیری و تحرک اسپرم فرد شود.

## عارض بلندمدت:

- عود واریکوسل
- هیدروسل (تجمع مایع اطراف بیضه)
- کوچک شدن بیضه




۲

۲



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  
لرستان

## واریکوسل



واحد آموزش سلامت- بازنگری ۱۴۰۳

- از یک هفته پس از عمل می توان به فعالیت های عادی بازگشت .
- طی دو هفته ی اول بعد عمل باید از انجام کارهای سنگین خودداری کرد ، ولی پس از آن ورزش و فعالیت سنگین موجب عود واریکوسل نمی شود و فعالیت بلامانع است .
- پاپسمان را دو روز بعد از عمل بردارید و اگر ترشحی وجود نداشته باشد ، پس از آن دیگر نیاز به پاپسمان مجدد ندارید .
- در صورتی که محل زخم ترشح نداشته باشد دو روز بعد از عمل می توان به حمام رفت .
- بسته به نظر پزشک پس از هفت الی ده روز بخیه ها خارج می شوند .
- حدود هشت ساعت پس از عمل می توانید به تدریج از مایعات استفاده کنید . چنانچه از بیهوشی عمومی برای شما استفاده شده است بهتر است غذاهای معمولی را از روز بعد از عمل شروع کنید .

منابع :

درسنامه پرستاری داخلی و جراحی برونز ترجمه زهرا مشتاق  
ویراست چهاردهم ، ۲۰۱۸

درمان :

درمان واریکوسل ، عمل جراحی است .  
معمولًا یک شکاف حدود سه سانتی متری در ناحیه بالای کشاله ران داده می شود و تمامی سیاهرگهای طناب بیضه قطع می شوند . بعضی از سیاهرگهای بیضه از داخل شکم عبور می کنند و جراح نمی تواند آنها را ببیند . حتی بعضی از مویرگها در داخل طناب بیضه که مستقیما در معرض دید جراح است ، قابل رویت نیستند ، بنابراین میزان عود بعد از عمل ، نسبتاً زیاد است .  
بسته به نوع عمل جراحی ، میزان عود بعد از عمل حدود ۱۰ درصد است . گاهی واریکوسل فوق العاده شدید بوده و صدھا سیاهرگ متسع در داخل کیسه بیضه وجود دارند .

## توصیه به بیماران عزیز:

- بهتر است تا ۴۸ ساعت اول بعد از عمل فعالیت محدود داشته و فقط در موارد ضروری ( مثلا برای رفتن به دستشویی ) از جای خود حرکت کنید .